HEXIDYL®

Hexétidine

Composition:

Hexétidine 100 mg - Excipient aromatisé qs pour 100 ml. • **Forme, voie**

d'administration et conditionnement:

Soluté buccal - Flacon de 200 ml pour usage externe.

• Propriétés:

HEXIDYL® contient un principe actif unique d'action rapide et prolongée, l'hexétidine, appartenant au groupe des antiseptiques locaux à usage buccodentaire et bucco-pharyngé. • L'hexétidine possède une activité antibactérienne et antifongique à large spectre, adaptée à l'ensemble des germes responsables des infections bucco-pharyngées. • HEXIDYL® possède également des propriétés cicatrisantes, hémostatiques et anesthésiques locales au niveau de la bouche et du pharynx.

• Indications:

par ses propriétés antibactériennes,

HEXIDYL® est indiqué:

- dans le traitement des affections buccales d'origine infectieuse: gingivite, stomatite, périodontite et pyorrhée;
- pour les aphtes douloureux et autres candidoses buccales; - comme désinfectant lors de chirurgie bucco-dentaire et soins pré et post-opératoires; - pour l'hygiène buccale quotidienne pour prévenir et combattre la plaque dentaire et la mauvaise haleine.

•Posologie et mode d'emploi :

Se rincer la bouche ou gargariser pendant 30 secondes
avec une cuillerée à soupe d'HEXIDYL® pur ou l'appliquer à l'aide d'un morceau de coton
pendant 2 à 3 minutes, 2 à 3 fois par jour. Ne pas avaler le produit mais le recracher après
usage. • Contre-indications: En raison de la présence de menthol, il est contre-indiqué
d'utiliser HEXIDYL® chez les enfants en dessous de 3 ans. • En cas d'hypersensibilité à
l'un des composants, l'utilisation du produit est contre-indiquée.

• Effets secondaires:

Rarement : réactions allergiques, irritation de la langue et des muqueuses buccales.

•Précautions particulières:

Un traitement prolongé est à éviter, d'autant plus qu'il pourrait
exposer à un déséquilibre de la flore microbienne normale de la cavité buccale. Le traitement
usuel ne dépassera pas 10 jours sans l'avis du médecin ou du dentiste. • HEXIDYL® est
destiné à un usage externe, il est donc recommandé de ne pas avaler la solution et d'éviter
tout contact avec les yeux.

• Grossesse et allaitement :

Dans les conditions normales
d'utilisation, HEXIDYL® peut être employé pendant la grossesse et l'allaitement, sur conseil
du médecin traitant ou du dentiste.

• Surdosage :

L'hexétidine est dépourvue de toxicité.
En cas d'ingestion accidentelle de faibles quantités, il convient d'administrer un antiacide
en suspension. Un lavage gastrique peut s'avérer nécessaire pour de plus grandes quantités.

• Conservation :

à température ambiante (15 à 25 C).